

Anteil der kompletten Follow-ups

Die Infektionen werden während des Spitalaufenthaltes sowie 30 Tage nach Austritt mittels telefonischer Nachbefragung (Follow-up) erfasst. Bei herzchirurgischen Eingriffen, Hüft- sowie Kniegelenkimplantationen wird eine zusätzliche Nachbefragung nach einem Jahr durchgeführt. Der Anteil der vollständig durchgeführten Telefonbefragungen ist bei der Interpretation der Ergebnisse relevant.

Ein hoher Anteil von Fällen mit abgeschlossenem Follow-up lässt auf eine gute Datenqualität schließen und auf das Bestreben, die Fälle möglichst lückenlos nachzuverfolgen. Eine vollständige Nachverfolgung führt jedoch auch zu höheren Infektionsraten, da viele Infektionen erst nach Spitalaustritt auftreten.

Pourcentage de suivis complets

Les infections sont diagnostiquées pendant l'hospitalisation puis 30 jours après la sortie par une enquête téléphonique (suivi). Une enquête supplémentaire est réalisée au bout d'un an pour la chirurgie cardiaque ainsi que pour les implantations de prothèses de hanche et de genou.

Le pourcentage de suivis complets est pris en compte dans l'interprétation des résultats.

Un pourcentage élevé de cas avec un suivi complet témoigne d'une bonne qualité des données et d'efforts pour suivre les cas le mieux possible. Mais, quand le suivi est complet, les taux sont plus élevés, car de nombreuses infections se manifestent après la sortie de l'hôpital.

Quota di follow-up completi

Le infezioni vengono rilevate durante la degenza ospedaliera e trenta giorni dopo la dimissione mediante un sondaggio telefonico (*follow-up*). Per gli interventi di chirurgia cardiologica e gli impianti di protesi dell'anca e del ginocchio, è inoltre previsto un altro sondaggio un anno dopo.

La quota di inchieste telefoniche portate a termine è rilevante per l'interpretazione dei risultati.

Una quota elevata di *follow-up* completi è sintomo di buona qualità dei dati e di volontà di monitorare a lungo termine i casi. Ciò comporta tuttavia un tasso di infezioni superiore, dato che molte infezioni si manifestano soltanto dopo la dimissione dall'ospedale.