

## Ergebnisse Swissnoso - Erklärungen zu den Pop-up Fenstern

Dieses Dokument beschreibt kurz die verschiedenen Werte, die in den Pop-up Fenstern erscheinen. Je nach Eingriffsart können die Informationen variieren. Die Buchstaben a – h erklären in der untenstehenden Legende den jeweiligen Parameter. Die Beispiele in der Tabelle sind fiktiv.

a) Adjustierte Infektionsrate	x% (95% CI) <b>[3.5% (0.3 – 2.9)]</b>		
b) Rohe Infektionsrate	n / N, x% (95% CI) <b>[4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]</b>		
c) pro Infektionstyp	Oberflächlich: n, x% <b>[1, 0.5% ]</b>	Tief: n, x% <b>[2, 1%]</b>	Organ/Hohlraum: n, x% <b>[1, 0.5%]</b>
d) bei NNIS-Kategorie	0: n, x% <b>[1, 0.5%]</b>	1: n, x% <b>[2, 20%]</b>	2: n, x% <b>[1, 10%]</b>
			3: n, x% <b>[0, 0%]</b>
e) bei Kontaminationsklasse	II: n, x% <b>[2, 2.8% ]</b>	III: n, x% <b>[1, 3.3% ]</b>	IV: n, x% <b>[1, 10% ]</b>
f) nach chirurgischer Technik	Laparoskopie od. minimal invasiv: n, x% <b>[1, 5%]</b>		Laparotomie: n, x% <b>[3, 15%]</b>
g) Anteil abgeschlossener Follow-up's	x% <b>[95%]</b>		
h) Bewertung der Erfassungsqualität	1. Validierung x/50, $\tilde{x}$ <b>[35/50, 35.0]</b>	2. Validierung x/50, $\tilde{x}$ <b>[34/50, 38.9]</b>	3. Validierung x/50, $\tilde{x}$ <b>[36/50, 39.2]</b>

- a) NNIS-adjustierte Infektionsrate in Prozent und 95% Konfidenzintervall
- b) Rohe Infektionsrate: n = Anzahl Infektionen, N = Anzahl Eingriffe, Infektionen in Prozent, 95% Konfidenzintervall
- c) Rohe Infektionsrate pro Infektionstyp: für oberflächliche, tiefe und Organ/Hohlraum: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- d) Rohe Infektionsrate bei NNIS-Kategorie 0 - 3: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- e) Rohe Infektionsrate bei Kontaminationsklasse II, III oder IV: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate. Dieser Wert wird bei Appendektomie, Cholezystektomie und Colonchirurgie veröffentlicht.
- f) rohe Infektionsrate nach chirurgischer Technik: n= Anzahl Infektionen nach Laparoskopie oder Laparotomie, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- g) Anteil der abgeschlossenen Follow-ups in Prozent
- h) Resultat der vor Ort durchgeführten Validierung der Erfassungsqualität für jede Validierungsrunde: x = erreichte Punktzahl des Spitals von minimal 0 Punkten (mangelhaft) bis maximal 50 Punkten (hervorragend),  $\tilde{x}$  = Median der Schweiz