

Ergebnisse SSI - Erklärungen zu den Pop-up Fenstern

Dieses Dokument beschreibt kurz die verschiedenen Werte, die in den Pop-up Fenstern erscheinen. Je nach Eingriffsart können die Informationen variieren. Die Buchstaben a bis i erklären in der untenstehenden Legende den jeweiligen Parameter. Die Beispiele in der Tabelle sind fiktiv.

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Adjustierte Infektionsrate | x% (95% CI) [3.5% (0.3 – 2.9)] | | |
| b) Rohe Infektionsrate | n / N, x% (95% CI) [4/200, 2%, (0.1 – 2.1)] | | |
| c) pro Infektionstyp | Oberflächlich: n, x% [1, 0.5%] | Tief: n, x% [2, 1%] | Organ/Hohlraum: n, x% [1, 0.5%] |
| d) bei NNIS-Kategorie | 0: n, x% [1, 0.5%] | 1: n, x% [2, 20%] | 2: n, x% [1, 10%] 3: n, x% [0, 0%] |
| e) bei Kontaminationsklasse | II: n, x% [2, 2.8%] | III: n, x% [1, 3.3%] | IV: n, x% [1, 10%] |
| f) nach chirurgischer Technik | Laparoskopie od. minimal invasiv: n, x% [1, 5%] | | Laparotomie: n, x% [3, 15%] |
| g) Anteil AB-Proph. ≤ 1 h vor OP (Kontam.klasse II) | x% [78%] | | |
| h) Anteil abgeschlossener Follow-up's | x% [95%] | | |
| i) Bewertung der Erfassungsqualität | 1. Validierung x/50, \tilde{x} [35/50, 35.0] | 2. Validierung x/50, \tilde{x} [34/50, 38.9] | 3. Validierung x/50, \tilde{x} [36/50, 39.2] |

- a) NNIS-adjustierte Infektionsrate in Prozent und 95% Konfidenzintervall
- b) Rohe Infektionsrate: n = Anzahl Infektionen, N = Anzahl Eingriffe, Infektionen in Prozent, 95% Konfidenzintervall
- c) Rohe Infektionsrate pro Infektionstyp: für oberflächliche, tiefe und Organ/Hohlraum: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- d) Rohe Infektionsrate bei NNIS-Kategorie 0 - 3: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- e) Rohe Infektionsrate bei Kontaminationsklasse II, III oder IV: n = Anzahl Infektionen, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate. Dieser Wert wird bei Appendektomie, Cholezystektomie und Colonchirurgie veröffentlicht.
- f) Rohe Infektionsrate nach chirurgischer Technik: n = Anzahl Infektionen nach Laparoskopie oder Laparotomie, Infektionen in Prozent bezogen auf die rohe Infektionsrate
- g) Anteil zeitgerecht (innerhalb einer Stunde vor Inzision) verabreichter Antibiotikaprophylaxe in Prozent für die jeweils angegebene Kontaminationsklasse (I bis IV), Ausnahme: Hernienoperationen und Cholezystektomien
- h) Anteil der abgeschlossenen Follow-ups in Prozent
- i) Resultat der vor Ort durchgeführten Validierung der Erfassungsqualität für jede Validierungsrunde (zeitlich unabhängig von der Messperiode): x = erreichte Punktzahl des Spitals von minimal 0 Punkten (mangelhaft) bis maximal 50 Punkten (hervorragend), \tilde{x} = Median der Schweiz