


Facts & Figures Akutsomatik

ANQ-Messungen 2020



POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN SWISSNOSO



- Elektive Knieprothesen
- Appendektomien (Blinddarmentfernung)
- Rektumchirurgie (Enddarmoperation)
- Cholezystektomien (Gallenblasenentfernung)
- Hysterektomien (Gebärmutterentfernung)
- Hernienoperationen (Leistenbruchoperation)

- Magenbypassoperationen
- Colonchirurgie (Darmchirurgie)
- Laminektomien (Wirbelsäulenchirurgie)
- Sectio caesarea (Kaiserschnitt)
- Elektive Hüftprothesen
- Herzchirurgie

AUSGEWÄHLTE EINGRIFFSARTEN





ohne Implantat

mit Implantat



Anzahl Spitäler/Kliniken




Anzahl Patientinnen und Patienten



MESSERGEBNISSE 2020








Infektionsrate
Anteil Wundinfektionen



Infektionstiefen

- Oberflächliche Infektionen
- Tiefe Infektionen
- Organ-/Hohlrauminfektionen



Follow-up

Anteil Eingriffe mit komplettem Follow-up (Nachverfolgung)

Follow-up-Dauer
– ohne Implantat: 30 Tage
– mit Implantat: 1 Jahr



Zeitgerechte Antibiotikaphylaxe

Anteil der Patientinnen und Patienten, die innerhalb einer Stunde vor der Operation eine Antibiotikaphylaxe erhielten



Detaillierte Messergebnisse:



www.anq.ch



TREND: Bei den fünf hier aufgeführten Eingriffsarten geht die Infektionsrate seit 2011 tendenziell zurück.