


POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN SWISSNOSO



- Elektive Kniegelenkprothesen
- Magenbypassoperationen
- Appendektomien (Blinddarmentfernung)
- Laminektomien (Wirbelsäulenchirurgie)
- Cholezystektomien (Gallenblasenentfernung)
- Hysterektomien (Gebärmutterentfernung)
- Gefässchirurgische Eingriffe an Arterien der unteren Extremitäten

AUSGEWÄHLTE EINGRIFFSARTEN

Colonchirurgie
(Darmchirurgie)



Rektumchirurgie
(Enddarmoperation)



ohne Implantat

Sectio caesarea
(Kaiserschnitt)



Elektive Hüftgelenkprothesen





mit Implantat


Herzchirurgie



Anzahl Spitäler/Kliniken





Anzahl Patientinnen und Patienten



MESSERGEBNISSE 2022








Infektionsrate
Anteil Wundinfektionen



Infektionstiefen

- Oberflächliche Infektionen
- Tiefe Infektionen
- Organ- / Hohlrauminfektionen



Bei Hüftgelenkprothesen werden nur Organ-/Hohlraum Infektionen registriert.

Follow-up

Anteil Eingriffe mit komplettem Follow-up (Nachverfolgung)

Follow-up-Dauer
– ohne Implantat: 30 Tage
– mit Implantat: 90 Tage



Zeitgerechte Antibiotikaphylaxe

Anteil der Patientinnen und Patienten, die innerhalb einer Stunde vor der Operation eine Antibiotikaphylaxe erhielten



Detaillierte Messergebnisse:



www.anq.ch



TREND: Seit Beginn der Überwachung im Jahr 2011 ist bei 8 Eingriffsarten ein signifikanter Rückgang der Infektionsraten zu verzeichnen, während bei 3 Eingriffen ein statistisch nicht signifikanter Abwärtstrend und bei 3 weiteren ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen ist.