



POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN SWISSNOSO



Eingriffsarten

Dargestellte Eingriffsarten


- 1 Colonchirurgie (Darmchirurgie)
- 2 Hysterektomien (Gebärmutterentfernung)
- 3 Elektive Hüftgelenkprothesen
- 4 Elektive Kniegelenkprothesen
- 5 Herzchirurgie

Weitere Eingriffsarten

- Appendektomien (Blinddarmentfernung)
- Laminektomien (Wirbelsäulenchirurgie)
- Cholezystektomien (Gallenblasenentfernung)
- Gefässchirurgische Eingriffe an Arterien der unteren Extremitäten
- Magenbypassoperationen
- Rektumchirurgie (Enddarmoperation)
- Sectio caesarea (Kaiserschnitt)

Anzahl
Spitäler/Kliniken

Anzahl Patientinnen
und Patienten



MESSERGEBNISSE 2024



Infektionsrate

Anteil Wundinfektionen

11.6% 812 2.9% 47 0.7% 118 0.4% 59 2.3% 65



Infektionstiefen (in %)

● Oberflächliche Infektionen
● Tiefe Infektionen
● Organ-/Hohlrauminfektionen




Follow-up (in %)

Anteil Eingriffe mit komplettem Follow-up (Nachverfolgung)^a



Zeitgerechte Antibiotika- prophylaxe (in %)

Anteil der Patientinnen und Patienten, die innerhalb einer Stunde vor der Operation eine Antibiotikaprophylaxe erhielten



a) Follow-up-Dauer ohne Implantat: 30 Tage, Follow-up-Dauer mit Implantat: 90 Tage b) Bei Hüft- und Kniegelenkprothesen werden nur Organ-/Hohlrauminfektionen registriert

Trend



Die Infektionen sind bei Kolonoperationen und Blinddarmoperationen zurückgegangen. Bei Hysterektomien sind sie hingegen seit 2011 gestiegen. Bei Herzoperationen und Hüft- und Knieprothesen sind sie seit 2021 zurückgegangen.



Detaillierte
Messergebnisse

www.anq.ch